REGIONE DEL VENETO

AZIENDA
Z E R O

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 439 posti di Infermiere
Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari – Ruolo Sanitario.**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 19 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i., si riportano i criteri di valutazione della Commissione Esaminatrice e le tracce della prova pratica.

Le tracce sorteggiate durante i 2 turni della giornata in cui la prova è stata espletata, sono le seguenti: n. 1 e 2.

Sono pertanto rimaste non estratte le tracce n. 3 e 4.

Criteri:

- attribuzione di due punti (+2) per ogni risposta corretta;
- attribuzione di zero punti (0) per ogni risposta errata, omessa o multipla.

PROVA PRATICA N. 1

CASO 1.

La signora Carla è stata sottoposta a intervento di mastectomia destra più linfadenectomia ascellare. Presenta un drenaggio in aspirazione.

1. In prima giornata post-operatoria l'infermiere nota che le perdite dal drenaggio sono pari a zero. Quale intervento è corretto attuare?
 - A. controllare che il drenaggio sia in sede e che sia presente l'aspirazione.
 - B. nessuno.
 - C. rimuovere il drenaggio e avvisare il chirurgo.
2. Quali di questi segni e sintomi sono indicativi di linfedema all'arto superiore?
 - A. edema, dolore e difficoltà di movimento.
 - B. solo impotenza funzionale.
 - C. solo rossore.

CASO 2.

La signora Rosa, affetta da diabete mellito tipo 2, è attualmente in trattamento con ipoglicemizzanti orali e, durante l'attuale ricovero, è stata aggiunta terapia insulinica.

3. L'infermiere viene allertato in quanto la paziente si presenta confusa, con sudorazione profusa e fredda e non risponde agli stimoli. Quale tra le seguenti è la complicanza più verosimile?
 - A. ipoglicemia.
 - B. ipotensione.
 - C. chetoacidosi diabetica.
4. Quale di queste azioni dovrebbe attuare prioritariamente l'infermiere in relazione al problema precedentemente ipotizzato?
 - A. rilevare la glicemia.
 - B. rilevare la frequenza respiratoria e temperatura corporea.
 - C. rilevare la saturazione dell'ossigeno.

CASO 3.

Michela, 62 anni, ricoverata per ascite. In programma paracentesi evacuativa.

5. Quale complicanza può insorgere durante la procedura di paracentesi?
 - A. shock ipovolemico.
 - B. lieve cefalea.
 - C. ipotermia.
6. Quale intervento **NON** è indicato in corso di paracentesi?
 - A. far deambulare il paziente.
 - B. monitoraggio dei parametri vitali.
 - C. far assumere una posizione comoda.

CASO 4

Luca, 2 anni, in pediatria per gastroenterite e calo ponderale. Non riesce ad assumere nulla per bocca a causa del vomito. Presenta febbre a 38,5°C.

7. Quale via è più indicata in questo caso per la somministrazione di paracetamolo?

- A. supposta endorettale.
- B. sciroppo.
- C. compressa.

8. Quali segni possono indurre l'infermiere ad ipotizzare un chiaro peggioramento delle condizioni cliniche tali da considerarlo "critico"?

- A. ipotonia, pallore cutaneo, mucose asciutte, scarsa reattività.
- B. pianto inconsolabile.
- C. aumento della temperatura corporea a 39°C.

CASO 5.

Donato 74 anni, giunge in Pronto Soccorso per Edema Polmonare Acuto

9. Quale tra i seguenti è un quadro di segni e sintomi caratteristici dell'edema polmonare acuto?

- A. grave dispnea, sudorazione fredda, agitazione, sensazione di soffocamento, talora rantolo tracheale.
- B. eupnea e bradicardia.
- C. dolore toracico con febbre.

10. Quali di questi **NON** è un intervento ipotizzabile per un paziente con Edema polmonare acuto?

- A. paziente steso in posizione supina.
 - B. somministrazione di diuretici su prescrizione medica.
- ricorso alla CPAP.

PROVA PRATICA N. 2

CASO 1.

La signora Maria è ricoverata in ortopedia per frattura di femore destro a seguito di caduta. L'intervento è programmato tra due giorni.

1. Identificare la risposta più corretta e completa con le indicazioni per la prevenzione del rischio di lesioni da pressione:

- A. valutazione del rischio, posizionamento di un materasso antidecubito e cambio di posizione ad intervalli regolari.
- B. posizionamento di un materasso antidecubito.
- C. cambio di posizione ad intervalli regolari.

2. La signora Maria suona il campanello; l'infermiere all'arrivo in stanza la trova dispnoica, tachicardica e la paziente riferisce dolore toracico. Quale complicanza ipotizza l'infermiere?

- A. embolia polmonare.
- B. emorragia.
- C. shock settico.

CASO 2.

Il signor Franco è affetto da miocardiopatia dilatativa e fibrillazione atriale cronica. Da due giorni segnala dispnea e astenia, riferisce di non assumere regolarmente la terapia; presenta edemi declivi agli arti inferiori, pressione arteriosa omerale 180/100 mmHg, frequenza cardiaca 130 bpm, frequenza respiratoria 28 apm.

3. Quale situazione si sta probabilmente verificando?

- A. scompenso cardiaco congestizio.
- B. insufficienza renale.
- C. ipotiroidismo.

4. Quale delle seguenti indicazioni dovrebbe fornire l'infermiere al paziente per la prevenzione delle riacutizzazioni?

- A. limitare l'apporto di liquidi, seguire una dieta iposodica, pesarsi quotidianamente, assumere regolarmente la terapia.
- B. fare regolari esercizi aerobici, seguire una dieta ipocalorica e assumere regolarmente la terapia.
- C. aderire ad un programma di riabilitazione cardiologica ed assumere un ansiolitico in caso di riacutizzazione della dispnea.

CASO 3.

Giuseppe, 45 anni. Viene sottoposto a toracentesi evacuativa.

5. Quale complicanza può insorgere durante la procedura?

- A. perforazione della pleura viscerale.
- B. frattura costale a volet.
- C. embolia polmonare.

6. Segni e sintomi da monitorare durante la procedura:

- A. comparsa di tosse, pallore cutaneo, dispnea, rumori respiratori.
- B. ritenzione urinaria acuta.
- C. comparsa di solo pallore cutaneo.

CASO 4

Anna, 15 mesi, in Pronto Soccorso Pediatrico per accesso asmatico acuto.

7. Quali di questi **NON** è un segno tipico di distress respiratorio nel lattante?

- A. rinite.
- B. utilizzo dei muscoli accessori.
- C. retrazioni costali in inspirio.

8. Mediante quale via è opportuno somministrare la terapia con salbutamolo (broncodilatatore)?

- A. aerosol o puff con distanziatore.
- B. endovena.
- C. non è mai indicato il salbutamolo in corso di accesso asmatico acuto.

CASO 5

Bruno, 37 anni. Caduto da 4 metri di altezza. Incosciente, respiro autonomo, circolo conservato.

9. Quale delle seguenti **NON** è un'azione da fare:

- A. iperestensione del capo.
- B. Valutazione ABCDE.
- C. eseguire una valutazione secondaria "testa-piedi" appena possibile.

10. Quale scala di valutazione utilizzeresti per valutare il grado di alterazione della coscienza?

- A. Glasgow Coma Scale o AVPU (Alert-Voice-Pain-Unresponsive).
- B. Mallampati.
- C. Scala di Conley.

PROVA PRATICA N. 3

CASO 1

Al signor Antonio è stata recentemente confezionata una colostomia.

1. In terza giornata post-operatoria, Antonio lamenta dolore addominale e nausea e l'infermiere rileva assenza di rumori intestinali e presenza di scarse feci liquide dallo stoma.

Quale complicanza ipotizza l'infermiere?

- A. ileo paralitico.
- B. infezione.
- C. emorragia.

2. In previsione della dimissione l'infermiere deve educare Antonio alla gestione della stomia. Quale di questi è un'azione corretta di stoma-care?

- A. lavare la cute peristomale con acqua e sapone.
- B. lavare la cute peristomale con soluzione a base di clorexidina.
- C. lavare la cute peristomale con acqua borica.

CASO 2

Massimo di 52 anni è ricoverato in Cardiologia a seguito di un infarto miocardico per cui è stato sottoposto ad intervento di posizionamento di stent.

3. Quale complicanza post procedurale potrebbe presentarsi?

- A. comparsa di aritmie pericolose.
- B. stipsi.
- C. epistassi.

4. Quali sono gli interventi prioritari dopo intervento di posizionamento di stent?

- A. riconoscimento precoce di aritmie maligne, controllo parametri vitali e polsi periferici, controllo del sito del cateterismo per evidenziare sanguinamento e formazione di ematoma e gonfiore.
- B. somministrazione di lassativi osmotici.
- C. somministrazione di vitamina k.

CASO 3

Francesco, 30 anni, viene sottoposto a puntura lombare per esame colturale del liquor.

5. Quale sintomo riferito dal paziente deve allertare l'infermiere che assiste alla procedura?

- A. comparsa di cefalea improvvisa.
- B. disagio per la posizione scomoda da assumere.
- C. dolore riferito in ipocondrio destro.

6. La procedura prevede una tecnica:

- A. rigorosamente sterile.
- B. pulita.
- C. non ci sono particolari accortezze da adottare.

CASO 4

Marco, neonato a termine. In 2^a giornata di vita si rileva un calo ponderale del 6% rispetto al peso alla nascita.

7. Tale dato è:
 - A. normale (fino al 10% si considera il calo ponderale come “fisiologico”).
 - B. indice di malassorbimento.
 - C. il calo ponderale non è un dato utile a verificare lo stato di salute di un neonato.

8. Per una più corretta rilevazione del peso del neonato è opportuno:
 - A. pesare il neonato senza vestiti e senza pannolino.
 - B. pesare il neonato su almeno 3 bilance diverse e poi confrontare il dato.
 - C. pesare il neonato in braccio alla madre e poi sottrarre il peso della madre.

CASO 5

Ludovica, 57 anni, si reca in Pronto Soccorso per dolore toracico costrittivo irradiato al giugulo.

9. Quale esame diagnostico è indicato come primo approccio?
 - A. elettrocardiogramma (ECG).
 - B. TC torace con mezzo di contrasto.
 - C. rilevazione della Frequenza Cardiaca.

10. In emergenza, quale tra questi farmaci solitamente **NON** è indicato in una situazione di infarto miocardico acuto?
 - A. Paracetamolo.
 - B. Acido Acetilsalicilico.
 - C. Morfina.

PROVA PRATICA N. 4

CASO 1

Il signor Luca è ricoverato in chirurgia toracica a seguito di lobectomia inferiore sinistra. Presenta un drenaggio toracico a caduta.

1. Quale di queste azioni l'infermiere indicherà al paziente in relazione alla sua mobilizzazione?
 - A. si può mobilizzare mantenendo il drenaggio sempre sotto il livello del torace.
 - B. si può mobilizzare ma solo mantenendo il drenaggio clampato.
 - C. la mobilizzazione è controindicata.

2. Osservando la ferita in sede di toracotomia l'infermiere nota che è arrossata, tumefatta ed è presente abbondante essudato dal colore giallastro e maleodorante. Quale complicanza ipotizza l'infermiere?
 - A. infezione della ferita chirurgica.
 - B. deiscenza della ferita chirurgica.
 - C. necrosi della ferita chirurgica.

CASO 2

Giovanni di 74 anni, è ricoverato in medicina interna con diagnosi di riacutizzazione di BPCO. Dopo allertamento dell'infermiere si rilevano i seguenti segni e sintomi: temperatura corporea 38 °C, pressione arteriosa 145/80 mmHg, frequenza cardiaca 104 ritmico, frequenza respiratoria 26 atti al minuto, dispnoico con saturazione O₂ 87%, valore stick glicemico 84 (mg/dl).

3. Quale ritieni sia il problema prioritario assistenziale ?
 - A. dispnea.
 - B. tachiaritmia.
 - C. iperglicemia.

4. In relazione al problema rilevato qual è l'intervento assistenziale prioritario da mettere in atto?
 - A. somministrazione di ossigeno preferibilmente con maschera di Venturi su prescrizione medica.
 - B. cambiare frequentemente la biancheria del letto.
 - C. fare lo stick glicemico ogni ora.

CASO 3

Ludovica, 67 anni, sottoposta a biopsia epatica.

5. Durante la procedura il paziente:
 - A. deve trattenere il respiro al termine dell'espiazione.
 - B. deve eseguire un colpo di tosse durante la puntura.
 - C. può respirare normalmente.

6. Dopo la procedura l'infermiere:

- A. farà assumere una posizione comoda sul fianco destro con applicazione di borsa del ghiaccio localmente; monitorerà i parametri vitali, verificherà l'insorgenza di dolori addominali e sanguinamenti.
- B. farà assumere una posizione sul lato destro con borsa dell'acqua calda.
- C. farà assumere del the caldo zuccherato.

CASO 4

Valerio 12 anni, ricoverato in pediatria per nuova diagnosi di diabete mellito insulino-dipendente.

- 7. Quali sono i segni/sintomi di iperglicemia che l'infermiere dovrà rilevare:
 - A. stanchezza, aumento della sete, aumento della diuresi, aumento del senso di fame.
 - B. ritenzione urinaria, calo della pressione arteriosa.
 - C. sudorazione algida, tremori, confusione mentale, stick glicemico 60 mg/dl.

- 8. Quali interventi educativi è prioritario attuare prima della dimissione?
 - A. educare Valerio e i genitori al monitoraggio della glicemia, consigli su dieta ed attività fisica, gestione della somministrazione della terapia insulinica, rilevazione dei segni e sintomi di ipo o iper glicemia.
 - B. insegnare ai genitori a somministrare l'insulina a Valerio in quanto è minorenne e non può autosomministrarsi la terapia.
 - C. accertarsi che abbia un appuntamento per una visita diabetologica di controllo.

CASO 5

Federico, 15 anni, giunge in Pronto Soccorso accompagnato dai genitori con frattura esposta di omero.

- 9. Quale è una possibile complicanza a lungo termine di una frattura esposta?
 - A. osteomielite.
 - B. irriducibilità.
 - C. dolore e impotenza funzionale.

- 10. Quali sono le priorità assistenziali in attesa dell'intervento dell'ortopedico?
 - A. gestione del dolore, immobilizzazione e precoce terapia antibiotica per via endovenosa su prescrizione medica.
 - B. esecuzione di un tampone microbiologico sul moncone esposto.
 - C. somministrazione di liquidi per via endovenosa